王

氏

醫

案

王氏醫案積編卷六原名仁術志 酒○童○撓○金 コープ・空間がど 真典 10号 一人・メート 爲○溲○投 九 杭 酉 o吞o石o吐 春 州王士雄孟英醫案 粶○磏○膏○之○胡 豆。石。竹。汗 銀○滚○茹○出業紳 花の灰の旗の面を表して、大の大の旗の面を表して、大の旗の面を表した。 ○其○連○躁舞 疑o ○痰○旋○妄萃坐 ○火○覆○聞◎臥 歸o連龍c得 不安如 粉○英膽○切 同 郡 九0解0星0其 畏 凌 夜 石。脈、人 O餘脈證漸平神 不較安惟不能 ○絃、捕○ 奪 九 峰 ○加○洪、知 雪○數○爲 羹 · 不、痰 · 竹 · 爲、餌 遯 · 指、白 斷

與 八沉臥不醒人 大劑涼潤清末 他醫或以前證為神 吐膠痰累日而眠食漸安是役也當 ·醒人皆疑之孟英曰痰熱尚熾也仍投大劑數帖果。 《潤清肅之藥直俟其旬日外大解不瀉藥始緩投復。 《之大解得行脘亦不悶斑皆透綻脈顯滑數而洪遂 4枕中丹以清包絡肝膽之今丹皮竹葉竹茹貝母百合 温 海(和) 和 兩病披猖之際學 補後證則以爲必敗 面垢孟英紹與十味温煦 ·味温膽 釈 卽 法

用之應而成得收功也 o 藥周身發疥各恙漸安蘊伏旣清始投滋養善後不僅病愈次死于勞損者何嘗盡是虚證毎為補藥償事投以廓清肺問之意不治乃延孟英診之兩腸甚數寸上洪滑敷逆痰多臥不愈云不治乃延孟英診之兩腸甚數寸上洪滑敷逆痰多臥不 年春更得一 . 1 . 1 > Man of 1/ may .. 1 | 1/ // 1 / 無不危之賴季權之夫人獨具卓識任賢不貳孟英始無 以下台) Elization の、、、。 敬思體氣素弱去冬因子殤于痘 | 卵亦精于醫偶患外感卽服清散之藥而證不減或疑其

○ 以野藥為肢脈便祕面赤冷汗脈來一息一歇舉家惶惶慮 一定以野藥湯送當歸龍舊太果得漸瘳秋閒其太夫人患鳳逍 一定外面不愈孟英謂其平世事人別 食喉舌皆赤與大劑清營藥數 · 人而不愈孟英謂其平昔善飲蘊、喉舌皆赤與大劑清營藥數服而 之診脈遲澀一 ·挟 按 痰 · 其 而瘥迨夏兩骰患疥外科 便皆行筋掣不眠長 阻ㅇ胸 肺間肺而 類虚不 必以老年 削內? ... 主o 不 一o舒 閉 身。且 而外脫昧 之。閩 の諸

氏醫案疫騙一樣八

福害不者虚 者児如應高 子不法補限 原尚之補 一肢和便行進粥數帖而痊方用紫苑白前竹站枳實旋一糖須以對證為良樂界一劑而飯至不歇轉為絃消再 完鈴枇杷葉 他。 蟆°英 蛸°的 石°时 踰 回 0秩0 英。心 汎

一小兒出程自此大實之證故

樂服之次日點形圖從細詢果未出痘但火勢甚熾恐其藏。

王蔚文會診所見略

清涼自

散熱熾陰傷與竹葉石膏湯撒熱存津而愈 偶患歯蚁繼 再華 氣湯數服而致劇也孟英與人劑神犀湯加知檗旬日 漸臭腐頭疼汎阻徹夜無眠蓋紊某作格陽蹬治息肝厥孟英千癸卯歲授藥一劑六載安然今夏 班疹之候斷非受寒也幸胡平昔欽信遂與冠因夜坐鳳寒患頭疼惡冷嘔吐肢冷流俠

宜降而反升之

酚通熱待正為 电亲背可真節於 可宜見此版口

味温

瀝o其 知o族

吞0

一息之停荷不如是用藥其能免乎此升攻托之藥而滿身密布形色粗紫漿 何o狂o倫c 或疑

者患病于越醫者但知濕甚而不知化中夏潘兩匝月泛濫為災季夏酷暑如以大劑犀羚元参巵菊木通知楝花粉 馬o洗 曜口苦不飢凍寒頭痛汎事愆期洩熱如火寒之間含人三令媳患搐搦閒日而作孟英馬勃巵貝山豆根等薬灌之数日而痊臨、治療薬薬而以菊葉濤塗吹以錫類散院去滿頸敷薬而以菊葉濤塗吹以錫類散門舌不出齒自汗脈澀絕穀類危其族兄辛 渠居停吳仲莊 知化热投以平胃散數的者如焚人多熱病有沈小化粉銀花之藥數日而命 如火乃厥陰暑瘧也地血英診脈粒数泛泛然 散。辛 煎 東。逆 **M险暑瘧也投** 养·一个 孟英 往 有沈小 射の勘 愈 干の卽 盥

泥今歲奇荒明年恐有奇疫但甘露二字人必疑為大寒之多一治營分規模已具卽有兼證何可通融司天在泉不必 附普濟解疫丹雍正癸丑葉天士先生定 君與諸好善之家依方合送救活不知若干人也。 **消毒二字世人或誤作外證之方因易其名曰普濟解疫丹異**。 。 天士甘露消毒丹神犀丹二方為濕温暑疫最安之藥一 11日人の間の方面に回帰し、公式11 數大渴溲赤稀水旁流與石膏大黃數下之而愈仲莊欲施。,,, 飛滑石市 綿茵陳市 濟人託孟英定一善法孟英目余不敢師心自用攻古惟葉 治營分規模已具即有兼證何可通融司天在泉不必拘 淡黄芩雨石菖蒲雨川貝母五

木通雨五 及步每年春分後十三日交二運徵火旺天乃漸温芒種 孟英自註云此治濕温時疫之主方也按六元正紀五運 或以神麴糊丸如彈子大財才4月3. 暑煉石流金人在氣交之中口鼻吸受其氣間而不去乃後十日交三運官土旺地乃漸濕温濕蒸騰更加烈日之後十日交三運官土旺地乃漸濕温濕蒸騰更加烈日之 成温熱暑疫之病則爲發熱倦怠胸悶腹脹肢狹咽腫 黄頤腫 丸。研· 細い射 連 **人開水化服亦**河。 熱則 每服三錢開水調服日一 薄荷 白豆蔻 各四 斑

二十里子子子子子

附 銀花 神犀丹 裁自可十全為上右参喻嘉言張石碩葉天。遠酒色尤為辟疫之仙方智者識之醫家臨 犀 哉清不者 在○看 氣o病 當 斯虚知 言 邪 堅 壁 (舌苔淡白或胃 汁磨 九良美清 此丹治之立效而* 以厚順或乾黃者。 識習野 之乎之 蒲 | 右参喻嘉言張石碩葉天士 旨故 黄芩南六直 耳試看茹素者流行之歲無論 肩各 生 地 獨可 柸 狡伶 汁水 證の 冼 能準 沈堯封 淨浸透: 淨雨 乏 青無 夏 此 邪o 代以 諸 中由 俏△ 化

香豉 各藥 煮丸生o兩入 暖。 將火切 炒忌 麥 研爾七 細。 以犀角地黄汁糞清 花 从小兒用半九日 粉 · 救 證 但 者 邪不即 兩各 如 四 解。 《無糞清可加》 和 情 ° 光 ° 營 ° 為 九。 躁。紫。傳
而 释。內 加切 密勿

投 濕 姚 那o因 大o藉o見 嫦 《人患此最 服 承 根 大解下如 多念 薇○液○迓 巵°得°孟 · 須用此多一 可挽 新整有本業氏參台負 其次帶紫斑危點監症 ○竹○斑 ○渡○ っ泥

陳蘊泉陡患昏譫貪夜乞診于孟英飯甚滑敷苔色膩黄乃平一一一中間理而愈。 竹茹黄連生地木通甘草為方調以眞珠牛黃始得漸安攺授或慮其成癩孟英曰痰團包絡也與犀角菖蒲元參鼈甲花粉已仍與前方調以紫雪數劑熟退神清而言出無倫獨如夢藝

脈o體 頗o弱 。類。不 署熱即所以顧 相。可 似○蓋

三氏醫案順湯表彰さ 趙子善患瘧畏冷不飢孟英診之脈滑敷苔黃溲赤脘悶善嘔 嘔腹痛上及于心胸切其脈頗平和是寒濕也與時行暑濕痢謝再華請孟英治乍浦人滯下證**整**夜百餘行不飢不渴而欲 虚證也清其濕熱而痊 高若舟庶毋患脫肛孟英瓜之趁而滑溲澀苔黃雖屬高年非 復感温邪失于肅清病日以甚迨孟英自豫章歸診已不可收 何新之亦贊 相徑庭投畫桂萸朴之劑數服霍 是講迹連投白虎加城而愈次年春因喪妾悲悼 投竹葉石膏湯加減以清伏暑而痊。 余明齊令堂秋陽惠伏暑孟夾已為治愈失于調理復思氣傷 察法合甘麥大聚以稱血而愈 聚法合甘麥大聚以稱血而愈 聚法合甘麥大聚以稱血而愈 省思久積憂勞眞陰欲匱竟難数義 專果仙遊 满喜冷飲米 以重型湯合雪養加石膏知母花粉。米教礙于下嚥小沒如沸夜不成眠

吳醞香大令宰金谿自春仲威冒而起迫夏徂秋痰多氣迎肌實丹灌之獲杯而起。 張箎伯紀綱李貴惠感數日忽然昏厥比沿途追求孟英往親 肉消瘦延至初冬諸證蜂起耳鳴腰痛臥即火升夢必下戈寒. 尚不絕與菖蒲膽星竹並旋覆等為劑和入重沸調以牛黃五 結漸能納敷權以清養病去肌充 寒善怒多醫咸主補虚迄無小效臥埋兩陽已將半載學公子 業已薄暮主人調自朝至此一息奄奄恐不及灌樂矣實不便 屈診孟英日余旣來且視之見其面色灰雕戴眼口開按其

起 深沉 且 仲之杪日 在: 于勞傷 |病者頭垂不仰氣促難言舌 無 温 補 醉い 施 · 交診脈

を 錯 雜 非 雜○投→僅 水 互 外 挾感而延 互相 外 家の [已經 燩 細り 動営津受燥肉削痰多升降愆常(を邪失于清解殆由内伏之積熱) 丽 年然溯其所自平昔善飲三十年。 水0痰0承 制o需 火o蒿 | 黯無苦 清鼈甲巵子金鈴等柔肝 里相招姑且按經設法以 - 里相招姑且は , 始由內伏之積熱人 面黧不渴 孟 孟英曰 疬 宣o泄o石 雖 調o

解大勢向

中降氣出入爲方閒佐龍薈凡直瀉膽經之酒毒紫雪丹捜いつの 各處賀年午後護日極其裕如且肌肉漸豐面黑亦退藥之の 始罷足亦漸温肺氣已得下降望日出署行香繼而兵火之夢。 清夜亦能眠迎春東郊審結積案亦不覺其勞矣方中參以 如是之神調養至開篆時起居如舊各恙皆瘥而孟英將赴の 洋麥生地麥冬充其液銀花綠豆雪羹化其積至庚戌歲朝c 招騙香為錄其逐日方案跋而帙之茲特采 |劑而舌布黃苔蘊熱漸泄服六劑而嗽減知 逐

英勢 服氣畏尿服之頗物 脇

織い緑の成の脇 老 病 定 原證延 略 則c肝o熱o疼 州 飲o升o反o欒 痊○楊 如 歌の力 の の 単の延 本の 温の風の身 二 毘 素園 此。 里。陵 面○過○風○身 氣○胃○陽○軀 明府 奖 川野其函懇臨香屈孟英診視而孟英世、川野其函懇臨香屈孟英診視而孟英世、上門野政治有聲精于醫學す。 阻0降0消0素 餘 辭 氣c無o燥o厚o年o不 bo權o 四o 另 痺o闢 血。窠 亦○囊○痩○温 您o據 其。爲 行い山 度○險○飮 c初o者 ○則○本 爲o氣o水 瘀○滯○穀 以。之 削 停の悍 積の遂

也氣經遭通燥而異稍氣按能安明則所者調傷便常性無量 出 爲時仍便則 不但胸方 丽 體便乾配岩 遁 矣o 腸○病 徽 宜·必 是 迨 o陰c欲 也○通○陡 以 五。 體 發の 氣 涎 涎 食~ 降り 虚○通 波 肝 而 浮0虚0 然の瀾っ肝 病 則 爲 滌 飲o 卽 似 逆 剛 空向 姚 貫っ痛の臓の 虚っ 在 氣 面 志 Lo欲 則。腑 腫り 滯 鄸 氟 桃 嘔ぃ虚い以 III 怒o 血 核 チい通 降 實 nt 火 息。 者の承 再 O 亦 黄 承 液o更 養o瘦 Í 日 衇 則 ∪得 爲 皆 # 增○散 至 實。暢。愈 色。子○體 似 肝○覺 茍 侀 漫 兩 似 情 張 關 m 屬 志 中 双 把 图c 怡っ握 **4**E 似

洞見臟腑必欲孟英一診以冀霍然遂黃夜備與專丁持函求 右擬方案來差星夜資回于十六日到宜素閱讀案狂喜以為 國維參徹上網繆之議是否有當仰就斤繩 。 錢先煮清湯代水煎藥 。 淡肉花蓉一錢五分吳爽湯炒黃連四分冬蟲夏草分 茯苓三錢旋獲三銭金鈴內二錢柿帮十箇仙半夏一錢 沙参八錢鮮竹筎四銭川椒紅二分 另用炙龜版藕各四兩漂淡陳海蛇一兩鳧茈一兩赭石四 正月十四日 烏梅內炭六分 銭五

丰

王氏踏案演编不公大

而非陰血之, 古春合肝木乘權胃土久吳脫尅病已入絡法貴本有關聚氣有升無降飲阻不宣嘔逆減餐亦將半載二便非虚求痊匪易據述贩亦屢遷似無定象夫旣流善幻顯屬于痰虚求痊匪易據述贩亦屢遷似無定象夫旣流善幻顯屬于痰虚求痊匪易據述贩亦屢遷似無定象夫旣流善幻顯屬于痰虚水痊匪易據述贩亦屢遷似無定象夫旣流善幻顯屬于痰虚水痊匪易據述贩亦屢遷似無定象夫旣流善幻顯屬于痰。 一方孟英迫于情不可卻二十二日抵宜暑初診案云證踰二十 虚○甜 0通 之枯春合 **肝木**乘枕 為補法難時變不能舍通字以木乘權胃土久受戕尅病已入 抵宜署初診案云 o法

主肅清一身之氣皆滯也輕可去實先廓上游不行蓋升降怎常樞機窒澀由乎風陽浮動治節横斜肺旣不行蓋升降怎常樞機窒澀由乎風陽浮動治節横斜肺旣不行蓋升降怎常樞機窒澀由乎風陽浮動治節横斜肺旣再診左脈如昨兼絃右寸亦轉緩滑中脘氣漸下降二便欲 白前一錢生白爽三錢紫苑一錢海石五錢川楝勺三錢 川貝一兩黑巵三銭 前方去海石加括婁三銭枳實一錢 另以生蛤粉生冬瓜子蘆根蘆菔各壹兩絲瓜絡五錢漂蜂 沙麥八銀鮮竹茹四銀青黛五分旋覆三銀酒炒黃連八分 一兩柿帶十箇先煮湯代水煎藥蒸鬚二分後下

清通し 五診各恙皆城眠食漸安火猶易升頭疼面亦頹疫結核前方去枳實歸尾城導水九五粒 |診脈來較靜小溲漸行雖未更衣已能安穀濁得下降導 主氏醫案演纂不多六 丽脂 善後方便 色轉正用此 **尚未蕭清賽血靖風自可使其向愈** 六診積痰下降頸核漸平舌紫口乾卯辰熱僭陰虚木旺氣道 前方去陳茶蒸鬚加石斛 沙参入錢冬虫夏草二錢女貞三銭丹参三銭鮮竹茹四錢 橄欖 川貝四銭金鈴肉銭牛 川斛五錢鹽水泡橘紅八分黃菊三錢旋覆三錢黑見三錢 前方去白前青黛紫苑黄連加銀花貝母黃菊丹參陳細节

犯邪尙在肺是以右寸之脈洪大宜令其下行由腑而沿則卽 余姪森伯惠發熱<u>面赤潟而微汗孟英視之日春温也乘其初</u> 前方去橘紅菊花金鈴屆子旋覆加石英沙葵茯苓各三 霍然投 知母花粉冬瓜子桑葉杷葉黄芩葦莖 厄子等或果 另以疾體甲漂蛇各一 | 兩章莖二| 兩絲瓜絡五錢煮湯代

治之初感總用汗藥勢必釀成大整 王氏醫案卷六完原名仁術志

一氏醫案續編卷七 原名仁術志 浙西王士雄孟英醫案 同郡沈宗淦辛甫र

是此為劑一服即減數吸而安耀與虎潛加泰艽而起 與建周令即患春温初起即神氣躁亂驚懼不眠兩級甚數孟 於監高若舟令即胡秋初四令愛患温初起即肢與妄言神情 於監高若舟令即胡秋初四令愛患温初起即肢與妄言神情 心。。。。。。。。。 治孰知病無定體藥貴得宜無如具眼人稀以致天枉載道歸 潜天數豈盡然軟 諸天數豈盡然軟 湯炒當歸吳萸湯炒黃連川椒湯炒烏梅延胡湯炒楝實

是以危險如斯須知與少陰虚喘判分霄壤切勿畏虚妄補投濇少痰無出路愈伏愈多一朝卒發遂壅塞于淸陽升降之路性然暴戾之氣久而必露柔膩之質反阻樞機治節不伸二便 以薤婁枳杏旋赭橋半苑茹蘆根蛤粉雪羹之 不為之辟易又得地黃等厚濁下趨之品迴寶其跋扈跳梁之 可妄治初服頗若相安者方中附桂剛猛直往無前痰亦不得。 一帶數是素患痰飲必誤服温補所致也家人始述去。 腎氣湯頗若相安至今人不吐痰矣孟英日病在肺。

於過 'n 可之法

邓市及冰伏其 地正吳氏所謂

清肺氣

而滌

愈

下級○

某孟英咸 始痊今年 時疫盛行醫多失手孟英隨機應變治法 黄o絃 粥○日 芩0大竹0而 不勞餘力而愈繼有張鏡江邀治葉某又銭希敏之妹文李去硝黃加海蛇蘆菔黃連石膏服一劑而戰解財和旨退進 麬 いいの、、、、、、、 語肢冷如冰月閉不開遺 吸石廣文令弟患春温始即 茹○緩、 元参石菖 下而瘳惟吳守旃之室暨鄭又僑皆下至十 恒月始 浦 C 下膠黑矢甚多而 則擔語發 <u>
狂連服</u>清 四神稍清咯進湯飲衣及承氣湯加銀花石鄉 湯o手c 解肪和苔退進 解 劑多量 餘 次 **斛o**鰤

朱佳木令尊思閒瘧年踰

上、上人公園など、古具は同じ、公本」とは

福芹香女校書、「連案也與清蕭開上で、「連案也與清蕭開上で、 母o張養之 一 聞氏婦孟 竹c囑 一度 恵 関連 できる 葉○援 穳 ○載○ 銀。于 花○孟 ·桑·英·瘧 葉·飯、而 絲·來、妊 而痛孟英診稣粒 汎愆寒熱醫 瓜o洪\身 0絡0 **劑吞當歸龍** 石。且 0 ○數○數○古、發 動而數 損輒投 0 温 c垢 熱伏 補っ 濁o沉o 駠 致 ○腰 厥 の腹 C 脹 知c墮о

宋氏婦患感反覆已經向痊忽然腹脹上至心下氣喘便瀉殯石膏藥二服而熱退知飢又數劑倂宿恙而愈矣 為劑果覆杯而病若失張養之目擊歎為神治。一章之孟英擬方挽救因以桂枝石膏旋赭杏朴芩华黄連通草 苔黃曰無恐也投清熱滌痰藥數劑霍然 。 新嘉順之婦弟吳某勞傷之後發熱身黃自以爲脫力也孟英一。 閉湯飲不能下嚥自汗不能倚息家人皇皇且極貧不能延診。

致成瘡而愈 |朱淳書令正患處吳某與表藥二帖發出赤疹神氣漸昏葉某| 清賞之法佐牛黄丸紫雪丹而寥翳皮巳塌亟令貼羊皮金不之邪擾営矣投元參犀角菖蒲連翹竹苑竹葉銀花石膏泄衞 甚赤淫熱已得下行其熱卽滅因家住茅家埠吝惜興金遠爾察鄉與數是淫溫重證故初起卽黃强與清解大便漸游小溲 溺痙厥始延孟英視之日雖形痩陰虧邪易擾営幸非溼盛之 知其素患耳聾目障爲陰虚之體改用犀角地黃湯二劑而遺 **輟樂七八日後復熟論語野鄭抽煙遺獨再想孟英視之淫熱 土氏醫案贖騙不卷七**

非所當用本年敗證甚多余每見神未全昏便不甚關惟胸前提每成結胸地黃滋滯實爲禁藥今人臨證不能詳審往往用驅尙可設法但心下拒按呃逆便關是痰熱尙阻氣分誤服升 **痞結不可救藥而死者皆升提之誤進或滋滯之早投也石北**。 而 咽疼口渴乃去紫雪前菖加射干山豆根知母花粉吹以錫。 日咽喉即愈胸次漸舒疹 回熱退去犀角紫苑射干

腹無痛苦處體脈宜潤養佐以從來麻仁當歸生地等藥多 加銀花巵 子竹葉海蛇鳧此漸安眠食唯大解久不行孟英 黄o水○黄o診 高

督不 孟英

重哲卿貳尹令正胎前患嗽娩後 **授甘涼緩劑旬** 日得堅黑矢 孟英診鉱 丽 愈。 虚紋.與數说、 為至寢汗, 茹○旣○苔

卫o败o此 逐愈 衣い初っ頭 つ甘い非の疹 草の傷の口 小の風の燥の / | | | | |

純光年七十 北涯拉孟英視之 花甲患感醫知其爲溼温也 日脈雖默不人處患溼温了 - -、蚔 歇代o 呃 水連朝諸器 寸・仍敷を能

蹤○致 **發聞遠自春閒偶患痰嗽醫投** 灰似府氣未宣痰溼熱阻其氣化流行之道也清宣 。 片通草 高何新之韙其讓因以旋茹巵棟杷杏萸連苑婁雪葵爲劑 。 ||兩煎湯煮樂投七卽減數服而大吐膠痰連次更衣。 金〇診安〇日 水(和屬) 水(和屬) 水(和屬) 水(和) 水(和) 展布尚 根の則、漸 ÞJ

新野老醫嚴少得以為可治竭力圖維仍獨于伏水則ध是其據也金遇火而伏其可慮乎繼而瘀血果吐納食無陰庇左升太過右降無權氣之經度既乖血之絡隧亦痺飲無陰庇左升太過右降無權氣之經度既乖血之絡隧亦痺飲 左眼胞忽雕右臂痠疼不舉耳聾神不清爽亟以元參丹皮菊苓茹銀翹桑華通草蘭葉為方煎以冬瓜湯服之偏身赤疹而 花巵子桑枝絲瓜絡石斛竹葉煎調神犀丹爲劑偶

此陰液充而餘邪自尋出路耳與輕清藥數帖果蹇後忽然肢腫偏發風塊瘙癢異常或又疑證之有變 投復脈湯去薑桂麻仁易西洋参加知母花粉竹葉蕨漿灌不進溲澀愈珍新之以爲難挽矣孟英曰急救陰液尚可轉以外患亦知病因溼熱連進木通等藥脈更細弱神益昏憊飢 眠0-・ これでは、一方の一方の一方の一方である。 目開舌潤或疑甘柔滑膩之樂何以能清溼熱孟英日陰 劑神甦脈起再服苦退知飢!! 殴身涼溺暢六帖後膚蛻安! 木通等藥販更細弱神益香蔥 : 也。 叉 服敷 c 可 o 機 虚 の剤

配梅連之法證漸輕減繼為其烟黨尼之多方蠻補遂致腹痛劑則滑泄必加鐵藥乩方備嘗莫效比孟英歸投以甘麥大棗 減養日下數十行皆瑩白堅圓如白蒲桃之形上紫血絲菊齊 豫章之診專科進以温熱之方而軟敢乃作更醫改授養營之 趙菊齋仲媳素患陰虚內熱時或咯血去年孟英已爲治愈旣 温養育經之龜板鹿霜歸苓杞菟甘芍鳥鰂蓯蓉蒲桃熟等藥 悔問仍乞援于孟英子仲景當歸生薑羊肉湯每劑吞雅膽仁 而汎事偶愆孟英診日病去而孕矣今春娩後患瀉適孟英赴。 コ上見名将名一美十 粒以龍眼肉為衣果兩服而便轉為溏痛即遞减再與

寒也進 と臺萸柴棗等藥數帖熱愈壯而二便不行更醫連 「水沙與野通既而益陽居停以為憂始延孟英視 「少腹拒按勢將喘逆雖屬下證而 「少腹拒按勢將喘逆雖屬下證而 「少腹拒按勢將喘逆雖屬下證而 「大り元參紫苑。」。 「大り元參紫苑。」。 「大り元參紫苑。」。 「大り元参紫苑。」。 「大り元参紫苑。」。 「本一樓大蒜」。 「本一樓大 札 汁。紫。一。屬
ル。苑。堤。下

數苔色滑脈微黃而渴喜冷飲便閱洩熱服食皆廢是伏痰內。 香吳萸等藥病益劇而嘔吐發熱略有微寒孟英按峽經滑且 而起矣。花等樂又服十餘帖凡三解黑矢而舌色復于紅潤眠食漸安, 盛肝逆上升而兼吸受暑熱也于吳萸水炒黃連枳實竹茄栝 莊芝階舍人令愛孀居在室陡患氣衝欲厥 夜小溲卽行氣平略寐又兩劑大解始下退熱而漸進稀燥。 去雪羹巵苑蓯膝地黄汁加西洋参麥冬石斛乾生地竹茹銀 石膏旋覆赭石知毋半夏雪羹服二劑吐止 **邓**臭當自服沉

参白被青蒿生地小麥稱豆衣石斛鼈甲竹葉兩劑熱退知飢 粒細虚數乃營陰素虧酷熱外爍風陽浮動痙厥之萌也于元 陳書伯太史令弟婦婉後三日發熱汗多苔黃眩悸孟英切飯陳書伯太史令弟婦婉後三日發熱汗多苔黃眩悸孟英切飯 顧氏婦半產後因奧飯脫痛人以為停食也進以消導症甚發 **壯熱如焚渴飲不飢覩物盡赤改投臼虎加西洋參竹葉蓮桿** 熱卧則右脇筋掣難忍孟英曰此非發散攻消可療予旋覆絲 悸汗不止去蒿薇加龍牡蓮心龜板石英而安繼又暑風外襲 日、大次党が大量の国際人が、こ 而解循不暢旬日始得豁然乃去石膏知母旋頳調之|而愈 啜而廖仍與鎮攝滋潜善其後而愈

黄升麻蜣螂為劑和以鲜银花十一不及兔兔男子!—…一種而拔出之時銀色已如煤黑孟英診脈滑數子犀角石膏硝兩月迄不能下且仍安穀而面赤齦脹欲挑每以銀鍼欺入齒局氏婦因飛鴉片而服外洋丸藥諸無所苦惟便以不通醫治 而病去及半再子清解化毒 太倉陸竹琴令正陡患心悸 一門銀色巳如煤黑孟英診脈滑敷子犀角石膏硝明銀色巳如煤黑孟英診脈滑敷子犀角石膏硝明銀色巳如煤黑孟英診脈滑敷子犀角石膏硝 **成冷如冰其子**

|血去過多木| |加去過多木| 起子循室婉後服生化湯二· 減投之 證有轉機 翼日再迓 孟英會同笛樓暨其舅氏許吉 趙 心o越o 合等湯病 而。煎 火c渴o 上浮酷暑 ||帖更因驚嚇|| 加 势 體

故變體如此非

行。山 ○脂○樓 然熱蘊 九。商 便 夜o退 中の以 如次又數日漸 如次又數日漸 。 ▶ 加。自 神怡 0 0梅 下焦患癰。 正 風 河善後甫: 邓身热微寒鼻 主議且 ○龍○木 膿雖卽 0骨0少 安粥食神氣亦清起坐梳 風 o授 滋 得果得 。 o水 c以 0涵0 女流清涕而陰液久女 公填不期酷熱兼旬以 海瓜 沿助其 地 潰陰液漏傷脈復空數浮大o 瘡 木o侮 | 膿乾餐 而陰液久奪 ○見○證 0加 頭夜能靜寐 熱始 潟 0世0 霖忽降 止っ 外患未施 日 漸 便

陳某患败败則先吐稀痰次則黃濃甜濁之痰緞之以深紅帶 脈見細弱之形肌無華澤之色汎不行而早斷舌紫黯以 外漢未免以成敗論然此案自堪傳 之血, 一瘦石夫人患滯下腹痛微嘔不飢口苦溲短耳鳴盂英診一遊桑葉枇杷葉生扁豆葦莖花粉為劑吞松石豬賭丸而及甚乃勞倦傷陽而兼溼熱蘊積也予沙麥生薏苡木瓜茯 仍能安穀別無所苦多藥不愈孟 新世事 | 虧情懷悒鬱] | 陽默熾五液潛消雖吸暑邪莫 | o 雪羹銀花巵子楝實 也

土氏醫案續編卷八

生暨莊舍人芝階為之序余以未與其事深以為歉秋閒仍過一仁術志者海豐張君柳吟所題孟英之醫案也吾師趙菊齋先 杭州王士雄孟英賢案

仁和徐然石亞枝續輯

息時感而氣逆不能眠醫皆畏卻特延君診甫按脈云甚滑疾。 。 是為娠象用藥必須顧及此時次媳於去秋娩後月事尚未

· 1. · Visites of to The series

孟英適有陳姓者牽半來謝孟夾頗疑之其人曰三月閒次媳

倏產 王氏墨案程稿、老木 少雖自問亦斷斷非孕至六月閒腹漸脹方謂有病不料昨。 行君為此言闔家未嘗不竊笑也迨疾漸平哺兒之乳亦不覺 然其伯仲之證吾皆診焉今巳十餘年矣猶憶伯字於關氏未 病家深不以吾言為然者緣病人之女兄二人皆死於虚勞也。 其所以虛方則羣聚補藥必以地黃爲之冠雖有參耆亦列於 子恒之室亦妊也諸醫作虛損治脈雖虛微耎數而滑象仍形 生來暮儂不能起矣前此延致諸名家徒日虛證宜補而不治 嫁而卒證非不治亦爲藥誤病中閱吾方案極爲折服且日先 一孫舉家敬服高明故來致謝耳孟英因謂余云咋診魏

云便血無至十

不可及也爱采秋冬諸案之治法不同於葬常者而續成一 的 開名醫吳穎昭先生之女孫也尤為惋惜伸逝於陳少帝少府 後即使用藥不乘而陽生陰長氣為血帥之旨尚末分腹况其 便血至三十餘年且已形痩腰疼嗽痰氣逆似宜溫補之法矣、、、、、、。 他 而嘉定沈醖書患此瀕危求孟英以決歸程之及否比按岆 係損證若季者因其家懷先人之見遂致醫人迎合誤事是 子吾聞而愕然何以閨中女子亦解談醫細詢始知爲乾隆 。 可數追秋仲果聞魏氏分娩母子皆亡方數孟英之卓見爲 一 卷

為方惟可呈則餘 程孟徐知十有年 氏為餘之 未寿年今惟 當血不便特 出矣間 血血

血

諛

温

補

凉ぃ莚ぃ侚

矣ぃ

也。

下。諸 用。頭。廖 目 證。也。翁。醖 不 首 湯。書 用っ頭っ寒っ

小装虚っ暈 必通瘀然を 開心若 枇ュ感の 杷ぃカ 葉っ排 有 旋o眾 旣○杯 旌。 英圖 産・即 覆 > 論 不 而い安く 花。徑 可 営の数 側。服 柏o其 液・服 測者。 脱っ愈っ 風○政 H 腸の 何 願っ旬 肺っ而 珀。其、室甘。脈、新 悪。非

髂い瘀

麥 o 飯 > 莊 芩o痰o而>子 胸ō 石c絃》芝 花の内の洪の芷 腹合 季 斛o數>階 粉の盛の體ン卿の 眉 舒·o 量 黄○而▶舍 蘭○暑 別駕 芩0促0人0葉0擾0多1為 竹o陽o汗o挾 军。可 茹○黑〉七 源の明の苔、風 艊 課 也。黄、暑 自 翹。乾。矣。帖 投 瘀 便》也c維 **患閒** 證始 大o血o連 海○是 揚い衝の 蛇o素 劑○嘔▶進 瘧。平。石。渴、清 寒 芷 膏。妄、解 秋 膏。安、解。患知。言。病 指 投 連○痰○則 卿 指·破血 自血 子o暑 職。以 職。以 等o內 等。內 為 母の徹 不 犀い夜 減o作 角。不 邀 寒 薬。伏っ則 劑 元o與o孟 湮 即。 擜 麥○欲 冶。 知o 言。清 珍勢之。益 石o即 母o孟 解o于 间 ∨花○英 愈、銀、地、飯、劇。 粉。視 花ぃ乃 経、其 黄の伏の滑、從 元。之。

外因泛湖 位申 爲。化。 證 局別投七即減旬日而痊。 心以桑葉枇杷葉巵子知品 個屬風温旣服温散所謂熱 一劑勢益甚而口渴無溺子 净澤許籌帶病延年之策果月事仍行而諸恙皆緩且能 九年矣往歲汎愆人皆襇將不起而孟英切其脈尚不細 **飯食日不過合米今秋** |平昔陰虚肝滯痛脹少餐暮熱形消咽疼喉癖不 益甚而口渴無溺孟英切其脈 宴客感冒風邪痰嗽頭疼不飢。 四母冬瓜子元参菊花花明熱得風而更熾也舌終明熱得風而更熾也舌終 の孟英切其脈與季秋無 飢寒慄自服 云經自 花。絳。無 粉o無o異o 蘇 貝o津o但 母。 母。 强。 宜。 浮 荆芥 細o孕

為傷格應手漸效翁極信服然培補年餘雖納食不減而肌肉 寒熱即楊數日始能强起大費不貲愈發愈劇至冬閒咽糜幽寒熱即楊數日始能强起大費不貲愈發愈劇至冬閒咽糜幽 **新嘉順於去年秋閒偶從梯半跌仆初無所傷旬日外陡發寒** 熱膝旁腫痛外科汪某治之潰後不能收功另招許某療之識 **鞑異迫季冬果得一子頗快而健** 彩滑左甚遞日豈僅可延其算哉且有熊熊入夢矣其家問之 削面色黧黑步履蹇滯且一旬半月之閒必患處疼腫大發。 赤音嘶乃惩孟英以决吉凶按服 切舊恙彌見其增君術雖仁。 一恐難再延其算矣及舉版|

銀花本粉。 關 如之女也汎愆一 功善後竟未察其體氣病情以致平時所有之溼熱痰火一 **令日啖梨蔗麒麟茶柿餅等物至五十日**諸· 隆嚴 後。 獪 疑似極多號日專科尚 自尋出路寒熱頻作/而醫者不 度次月仍行方疑其病也盂英診日尺 置僅知温点 爲○憔 難措手陳肖巖孝廉媳。 法既潰 △、職妄指 元参黄柏 0 外吹以錫類散 後更以温 0 體腴善步 野けない 齊

瑟無弊 迎血之劑亦清

| 「通草加麥葉投之服後腹仍痛復下瘀塊纍纍而渚ますで通草加麥葉投之服後腹仍痛復下瘀塊纍纍而渚ますでは、」」が「女馬者」枚次日諸恙較減乳汁大流再以前で 中出醫謂類瘧與温化之藥病月甚交八日克保而墮墮後惡露雖行而寒熱頭疼時或孟英偶診亦以孕斷轉驗甫三月患胎漏道 克保 上して、波型を下断具は用するだっ o診 o之o 0脈 旋o來丶 何以斷為瘀阻 而再行其血 蛤殼等(1) 新血為 加温 或自汗山 絡O耳O流 栗而諸恙若失或 0予0英 劑 0桃0始 服後腹 産如

堕而諸經蔭胎之血萃而未漁淺者雖出深者尙雷况是血瘍未熟强擠其膿尙有未化之根柈不能一齊盡出所以胎; 帝落諸經陰胎之血貫串流通苟有瘀停必形痛脹堕胎 上年与一年新一人 苦願知其素患脫血元氣久虚改用参附等藥勢。 。 齊盡出所以胎雖 加 旺 鴵

古 子・水・問ぃ 與○足○必○兩○氣 方書。第0英0海 石이冷の即の氣の喘 膏0面0為01 黄0紅0虚0之0治 諦っ脈の日 皆o劇o無 印 毋0不0年0肺0何 屬 婁0非0飯0痰0常 壅 條 可 冤 危 仁0痰0病 蠣、小○調 通0阻0起0氣 草°櫃°于°不°請 海°機°暴°流°盂 肯 蛇°有 苔 行°英 竹o升o膩o虚 瀝い無3痰0促0焉3仲 っ濃い難い孟 冬 ○遂 有○未 日○忠 葉 > 授 o 進0道0鹽0

發寒症 脈、梅c室 蟲○厥 眠 其。汗。 ·脱·上、陡 。堪·溢·患 夾o等 女 不多抑鬱乾嗽は火火 一瀬 一瀬 知三瀬 灌前 設 此 等潛陽鎭逆之方邊按一二日變恐不可知矣藥至第三夜僅有寢汗而巳四劑後諸恙不作之方藥甫煎果欲厥亟灌之卽寐次日黃昏猶 沙。劑 原之停目不交睫服藥無功求去為人養夫人而知之者王杞庭之沙参地黃麥冬等以滋陰善後沙参地黃麥冬等以滋陰善後 (甫煎果欲厥亟灌之即) oiso 庭之 が。 年 而安族 鍁 冬。已、爾、標

水陽之素 類 水陽之素 類 水陽之素 類 飢° 况作鬱治而再用開泄之品 0; 患疾嗽氣逆惟飲薑湯則胸次舒暢醫者以爲具: 馴致 咽痛不食者也灰刺便悶 耶故辨證爲醫家第一 為高年而言然有似是而非者 日而邊繼有陳舜廷之父 公而溢苔色滿布でる。 額 右の治療 要務也。 ○蛇○類 倸

不能 生年踰花甲偶因奔走之夢时也云中年以後已行降令清醒的為 外阻清陽· 灰ぃ 據○ 当安指為寒麗地 然然無馬家日湯喜真湯名不道 川陽易阿平の 言無此 明切也方 11,0 间 C

許此 0廖0草0 李(投 黄 ° 滲 ° 草 ° 連 ° 水 ° 鳥 ° 温補之方則氣 喘 笛 知り以 當·服 卿 母c小 欆 花○柴 延c 心分置菔而安繼因作勞太早而復發適孟英八胡一劑勢復劇孟英子温膽湯去甘草加生人起季秋孟夾當清其伏暑而將愈其從母亦知 澳 粉屬菔而安羅因作勞太早而胡一劑勢復剧孟英子温膽湯 川 清 氣愈窒塞濁亦上行況在高年告危極易也血分之熱而導溼肛痔亦平設不辨證而服即漸行改用防風地榆丹皮銀花荆芥槐蕊即漸行改用防風地榆丹皮銀花荆芥槐蕊 解 而瘥迨季冬移 核。 溼・風費子 地海澤の 榆門 海 皮。金。 銀·砂。 、瘧 花○調 左丶復 絃、開 勁、作o 生石竹。亦知醫 也い服 奖 斛の而。 、跳

賢o眸 群氏醫案を 則 則 机。上 杷の野った 升o地o豕 矱○柴○黄○或 之0九0效 每以補 耗o之o尤o 蒿o率 散o陰o共 秦o補っ 思素屬 (対白薇) ||必不能 不。疑。質 銀り寮の湯 花0用0多 患痰嗽。 宜○法 相 與 海っ西の乃 蛇の洋の肺 動 方連投 が知って 副氣逆夜一 啡○痰 py 足の所の治の 剤い竹の餘の 大 肝 能眠。 蛤,膽 11 膠 殻の之 機の石の風 滋0升0不 塡つ聚の遠 者0者0之 帄 原 解○陽 服

藥○威○橘○粉○調○投 則入 之○喜○皮○爲○以 恢 助○九○黃○九○楚○膩○滑、納痰○肅○連○早○蓉○溼兼、食 趁0漸 溼○上○蒺○服○黄○濁 ○耳○源○藜○温 滅い 稍 沾 蛛o 失 嘔 竹o肝o熟o 冠 觤 地の焦の限 瀝。以 朱 稷 o 防o吞 治の為つ黨の州の反 各 酸이 九0參0皮0礙 肝 老皆 孟英 午0自0茯0平 水 П 過 服の木の苓の中 焮 安に培い枳の楝い運の升の視 셌 肺 脈 中つ質の質の左 金 左丶 用o土o菖o砂o 强 前) 微、 避○暮○扶○末○降 出 数ο 湯い吞の苔い藕の不 久 右

北

完置英視焉舌縮底絳苔黑如漆口開莖菱脈細數而絃右則鏡江診之日冬温也連與犀角地黄湯而無起色二十日外始 病前一日曾啖生蘆菔一枚而大便又溏苔色又白今年又爲 溼土在泉遂指爲中虚寒溼之病參术桂附多劑率投馴致舌 一級人程某在余姑丈許辛泉典中司會計仲冬患咸醫者間其。 黑神昏尙疑為大虛之候禾中沈柳衣見之知其藥誤另招張 大氣運而硜硜然泥夫司天在泉以論治何異癡人說夢耶安 是以火證偏多夫藥者補偏之物醫爲教弊之人豈可不識 按之如無陰液盡燥温毒深蟠甘露瓊漿不能復其已竭之津

は時或自汗乃氣液兩竭熱毒逗畱之象必從前過服温補之口乾始延孟英診之左脈粒細而數右粒滑而空苔孢黄腻根口乾始延孟英診之左脈粒細而數右粒滑而空苔孢黄腻根 內伏更將何法以生之耶堅不立方其家必欲求藥以期扶 樂否則熱退在十四日之期何至延今五十餘朝而見證若是 o 矣俄而果敗繼有潘聖徵于仲冬患咸至十四日退熱之後在 四耳孟英曰此卽釀病之具矣治病且難何况有如許之薬毒。 。 ○ 之棘手哉其弟鴻軒云此番之病補藥不過二三劑惟仲秋患 不知飢羣醫雜治迨季冬下旬轉爲滯下五色假腫裂血溲澀

唇瘡口糜舌疱語醫束手復請診于孟英脈與潘同不可救樂為老年胎瘧眾楚交咻病不能愈延至季冬亦轉爲痢且膚腫。 者期于速愈廣微醫療或以爲證屬三陰或調是子母擔或指 謝譜香體屬久虚初冬患嗽痰減食適孟英丁艱邀施某視之 日伏暑所化且體屬陽强而多痰火切勿畏虚輒從温補奈病, ・ る遂力解之叉沈聽松處尹太夫人季秋思瘧孟英嘗往診之。 度歲孟英日是則可也以白頭翁湯加銀花綠豆歸身白芍陳 焦苔、南退鐵色亦正舉家喜出望外後ŋ孟英嗣之奈脈無轉 米燕根蘭葉藕爲劑面以補中益氣大料蒸露代水煎藥服後

此 關○增○脈〉飢 葉○肝○舌ヽ無 柿○横○紅○溺○ ○参○虚○手 חלנ 而o以 狂0中0术0健0為 木ぃ杏o失ぃ敗 行0澤0職0矣 倩○水o瀉o誤 厥 疾 蠲0桶0投0% m 痰○皮○滋○仍 o增o有 半○順○延 盂 夏○更○孟 m 愈0茹0樞0診 ·者c 薏⁰桂◦甚 痰ο剛ο耎◦ 患 藜○徒○苔

地一大舌紫無苔の地一大舌紫無苔の地一大舌紫無苔の神・一切苔膩口酸耳噌 桃○大○視 范 富歸元參服 舌、之。廉 珀。從 子文言さには見ら聞した。 居夫婦與其合愛 憗○瘀 泊。血 0則 劑 心解 兩 鳴不 旋 牡の焦の 服 子 桃 c 间 蠣o熱c行熱 學。而 覆 珠の柿 **腅**血 带。板。 加 刀。 紅心 飢 果 花。 《行神情爽慧》 豆の陰の 熟 胂 40虧0 憊っ地 胡 脘 縢o之o逆 之o象o不 桃 痛 予四洋の対象の 肉 。成 縱 丽 衇、歸○服 至、投 刨 \mathcal{F} 旋c 獲 渭 行、形 知 1116:

二劑起之 豆窓為養 核ぃ c遂 承(便氣)背 致 水客邪阻戀纏 起之抑何神數B 聞 加。 之 抑何神數因億四。與也三人之證醫者與 韓 海c 組. 黄 c 林年難 <u>蘆</u>藤二八大湯服 劑 悶 H 肝。 c四 而 黈 古智謂可危 一 全 康 居 尊 痊o 堪の 伙 派來粒 **平夏** 帯 材 患症。 而治之日 iiii ilij 行。 數質係 颖 解っ 平川 料 禾日 训 魁 服藥盒 儿 劇の誌 府 則 服 涩 北 Э 也投熱般 桃。尿

可能 宝 聴泉。

毋o睛o o女o自 o貞o行o杞 枇ぃ赤。 陽○陡 早○貴 蓮○夜 越。然 思。 當 杷○忌 歸 葉o投o 等 竹o温o 葉o葉o燥o 肝 陽復 元。復 而 平い参の迎 溼 人忍湯虚而之 迎衣衾再速云 迎衣衾再速云 **下嚥之** 僭の繼 甘o孟 ○宜 草。英 ッチッ 叉 大作勞復感仍然一个一次 のののでである。 蓮の軽い 麥。治。後。心。清。竹。脈即為。用 即覺 劑。元。 耳 英圖 火 啜而 時 心。促 升 授 乙っ雄 以。不 解ら 輕 氣 和 湖 。遊 安 。 巵 。 心 。 即 衡 自 子 。 鎃 淸 子o: 竹이王 謂 法。肝o投o至 氣 茹い 数・眠い雨 之の牝っ言 虚。旋。 陽の蠣の語 劑 而,神 変給設 而 龜○支 遽 錄 板 ○ 椒 ○ 水 ○ 水 ○ 水 ○ ル 後 の細の情 仍 煩 又 爲 ○ 燥 ○ 因 怫 雷o甲o頻 陰。越

王氏醫案卷八原名仁術志 繼子多劑育陰清肝始得全愈又其媳新產之後頭痛甚劇孟粉隨灌以大劑二至二冬三甲元參丹參人參貨連童溲而想 ,英按其脈右甚滑大手淸陽明法得大解而蹇 To added to to to made a service

跋

立法母乃偏乎余曰火烈民塾而畏之故鮮死焉水懦弱民狎 火邪六氣外侵皆從熱化自然熱證浮于寒證涼解多于温 或疑孟英醫案二種雖證治多條而善用清涼短于温補以之 之具也見是病用是藥宜熱宜涼初無成見然七情內動即是 之而不感温補則人狎而玩之設以温補殺之而不怨徇人欲 而玩之故多死焉藥則反是涼解則人望而畏之設以涼解生 正是補偏救弊隨時而中之法胡可謂之偏耶再以余數十年 而求合于世者咸操此術焉而孟英者讀書明道知樂爲治 **医肾**层 療 編 原 容 不 畫 補

一直擊規族之病而驗之大抵不死於温則死于補卽不遽死 而漸成錮疾亦遷延以死言之痛心指不勝屈姑就余一家而 **郭此可悟又何疑歟** 思滯下切科治之漸劇愈議多附挽回余謂般變不遠與其死 次男亦然乃變癇證久之亦殞吁可不慘哉可不畏哉迨季男 于火寗死于水徑投犀角等藥多劑得生考古有救濕死之方 旋變癲狂延數年斃余長男周歲發熱醫謂慢驚投參术而殞 而尋斃余從毋患痰火醫以其右尺之沉微無力也而投温 言胞叔偶于秋閒發熱舌色黃膩醫以其七旬有餘也投温補 庚戌秋七月族兄榮瘦石置 豧